

ストマの取り扱い

抗がん薬投与中、投与後約2日間は便や尿の中に抗がん薬の成分が含まれています。周囲に抗がん薬の成分が広がらないように以下のことに注意しましょう。

- 尿や便を破棄する場合は使い捨てのビニール手袋を使用しましょう。
- この期間は装具を使い捨てにしましょう。
- 廃棄する装具や使用したビニール手袋はビニール袋に入れて密封して燃えるゴミに捨てましょう。
- 装具の交換はできればこの期間の終了後に日程を調節しましょう。
- 尿や便が皮膚に付着した場合は石けんと流水で十分に洗い流しましょう。
- 尿や便が周囲に付着した場合は前述の掃除の項目に沿って行いましょう。
- ご家族がストマ装具の処理など行う場合は、使い捨てのビニール手袋、ビニールエプロンを使用し尿や便に直接触れないように注意しながら上記同様に行いましょう。



この冊子は治療を受ける皆さまに少しでもお役に立てますよう作成しています。
この冊子にある情報は2022年4月1日現在の国内外のガイドライン等に基づくものです。
本著作物に関する権利はすべて日本ベクトン・ディッキンソン株式会社が保有します。
本著作物の一部またはすべてを無断で複写・複製・転載・改変または流布することを禁じます。

©2022 BD. BD and the BD Logo are trademarks of Becton, Dickinson and Company.

26-119-00 2022.09 (BDJ-1435)

